



Superogród24

<https://superograd24.pl> 505405740 biuro@superograd24.pl



Huzar Activ Plus środek chwastobójczy 5L

Nr katalogowy: 5908229376423

Kod EAN: 5908229376423

Producent: Bayer

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

780,00 PLN

Opis produktu

HERBICYD selektywny o działaniu układowym stosowany nalistnie, koncentrat w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD).

Środek pobierany jest poprzez liście oraz korzenie chwastów i przemieszczany w roślinie.

Środek blokuje działanie enzymu - syntazy acetylmleczanowej (ALS), co prowadzi do zahamowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek, jak również powoduje blokadę auksyn tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin co w efekcie powoduje wstrzymanie rozwoju i wzrostu chwastów.

Najskuteczniej niszczy roczne intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie 2-4 liści. W momencie wykonywania zabiegu miotła zbożowa nie powinna przekraczać fazy końca krzewienia. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 1 do 3 tygodni od wykonania zabiegu.

Szybkość działania zależna jest od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów, panujących warunków atmosferycznych – temperatury, wilgotności powietrza oraz tempa wzrostu chwastów

Zawartość substancji czynnych:

2,4-D w postaci estru (związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (28,8 %) jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 10 g/l (0,96 %) tienkarbazon metylowy (związek z grupy triazolinonów) – 7,5 g/l (0,72 %)

Zawartość sejfnera: mefenpyr dietylowy - 30 g/l (2,88%)

Chwasty wrażliwe:

- bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita,

- jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła
- zbożowa, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przetacznik
- bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna,
- rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne

Chwasty odporne: perz właściwy.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek jest przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania: środek stosować wiosną od początku fazy krzewienia roślin do końca fazy 1-go

kolanka (BBCH 23 - 31). Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.