



Superogród24

<https://superograd24.pl> 505405740 biuro@superograd24.pl



Starane 333 EC/0,5 L herbicyd w formie koncentratu

Nr katalogowy: 3362130142942

Kod EAN: 3362130142942

Producent: Corteva

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

69,00 PLN

Opis produktu

Starane 333 EC to herbicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Stosuje się go nalistnie do powschodowego zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych.

Starane 333 EC jest środkiem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczanym do korzeni roślin powodującym zahamowanie wzrostu roślin, a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-7 dniach. Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju. Środek stosować podczas dobrej pogody, w okresie intensywnego wzrostu chwastów.

Chwasty wrażliwe: bieluń dziedzierzawa, gwiazdnica pospolita, koniczyna biała, niezapominajka polna, przytulia czepna, poziwienik szorstki, rdest powojowy, rdest ptasi, szczawie.

Chwasty średniowrażliwe: gorczyca polna, powój polny, rdest ziemnowodny, rogownica skupiona, samosiewy ziemniaka, zwrotnica zwierciadło Wenery. Chwasty odporne: przetacznik perski, dymnica pospolita, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, psianka czarna

STOSOWANIE ŚRODKA

- **Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto, owies, pszenica orkisz**

Termin stosowania: Zboża ozime - opryskiwać wiosną, po ruszeniu wegetacji od początku fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka (BBCH 21-32), Zboża jare - od początku fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka (BBCH 21-32) Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,54 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie; średniokropliste.

- **Kukurydza uprawiana na nasiona**

Termin stosowania: Opryskiwać w fazie 1-6 liści kukurydzy (BBCH 11-16). Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,54 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

- **Plantacje nasienne traw, użytki zielone (łąki i pastwiska)**

Termin stosowania: opryskiwać od marca do czerwca od fazy 3 liści do fazy drugiego kolanka (BBCH 13 – 32). Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,54 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

- **Trawniki, murawa**

Termin stosowania: opryskiwać od marca do września od fazy 3 liści do fazy drugiego kolanka (BBCH 13 – 32). Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,54 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.