



Superogród24

<https://superograd24.pl> 505405740 biuro@superograd24.pl



BASF Kinto Plus 1L środek grzybobójczy

Nr katalogowy: 4041885183064

Kod EAN: 4041885183064

Producent: BASF

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

223,52 PLN

Opis produktu

FUNGICYD – zaprawa nasienna w formie płynnego koncentratu (FS) o działaniu układowym i powierzchniowym.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

Fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli)- 33,3 g/l (3,0%),Fluksapyroksad (związek z grupy karboksamidów)- 33,3 g/l (3,0%),Tritikonazol(związekz grupy triazoli)- 33,3 g/l (3,0%).

Opis działania

FUNGICYD – zaprawa nasienna w formie płynnego koncentratu (FS) o działaniu układowym i powierzchniowym.

Sporządzanie zawiesiny do zaprawiania i technika zaprawiania

Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka. Przed użyciem wstrząsnąć. Zawiesinę do zaprawiania sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu. Do połowy wymaganej ilości wody dodać odpowiednią ilość zaprawy. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika zaprawiarki z zawiesiną. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, dokładnie mieszając. Zaprawiać z włączonym mieszadłem.Ilość wody jest związana z typem zaprawiarki oraz wilgotnością ziarna. Większa ilość wody na ogół poprawia wyrównanie pokrycia ziarna zaprawą.

Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki. Przed rozpoczęciem zaprawiania zaprawiarkę poddać kalibracji.

Stosowanie środka:

Środek przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawieszinowych

ziarna siewnego.

Pszenica ozima

Pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy. Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1050 ml wody

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień ozimy

Głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia. Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1050 ml wody

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenżyto ozime

pleśń śniegowa zbóż i traw Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1050 ml wody

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Żyto ozime

pleśń śniegowa, zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta. Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1050 ml wody

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień jary

głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia. Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1050 ml wody

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Żyto jare

fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1050 ml wody

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1